

KLOISTER 10 SC

INSECTICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

CHLORFENAPYR 70 g/L / BIFENTHRIN 30 g/L

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	PIRROL, PIRETROIDE
USOS	Insecticida
CATEGORÍA IRAC	Chlorfenapyr: 13 Bifenthrin: 3A

MODO DE ACCIÓN

KLOISTER® 10 SC es un insecticida de uso foliar, de amplio espectro, que actúa por ingestión y por contacto. Su ingrediente activo Chlorfenapyr actúa sobre el sistema respiratorio de los insectos al causar un corto circuito en el gradiente de protones mitocondrial para que no se pueda sintetizar ATP. Su ingrediente activo Bifenthrin actúa sobre el sistema nervioso de los insectos al mantener abiertos los canales de sodio, causando hiperexcitación y, en algunos casos, bloqueo nervioso.

USOS PARA ECUADOR:

USOS			
CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C. días
Tomate riñón <i>Solanum lycopersicum</i>	Cogollero del tomate <i>Tuta absoluta</i>	1.5L/ha	1
Maíz <i>Zea mays</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	0.60L/ha	30
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Gusano cogollero <i>Spodoptera frugiperda</i>	0.60L/ha	30

*P.C.: Periodo de carencia: Tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del PQUA y la cosecha.

PRESENTACIONES

1 L, 500ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **PRECISAGRO®**.